



Direction de la santé  
Bureau de veille sanitaire

# Bulletin de Surveillance Sanitaire

## Surveillance et veille sanitaire en Polynésie française

Données du 11 au 17 février 2013  
(Semaine 07)

### A RETENIR

#### Syndrome grippal

- Activité syndromique en forte augmentation (notamment à Tahiti, Raiatea et Rapa).
- 5 cas de grippe A (4 de type H3N2 et 1 en cours de typage) sont confirmés à Tahiti sur les 6 prélèvements analysés.

#### Syndrome dengue

- 1 cas de DEN type 1 est confirmé en semaine 7 sur les 54 prélèvements analysés.
- 4 cas sont confirmés (DEN 1) en semaine 8.
- Au total en 2013, 7 cas autochtones ont été confirmés. 6 semblent épidémiologiquement liés (Moorea), pas d'antécédent de voyage hors de Tahiti pour le dernier cas. Les mesures de lutte anti-vectorielle péri-focale ont été mises en place autour de tous les cas.

#### Diarrhées

- Activité stable.

#### Fièvre

- Activité en forte augmentation aux urgences CHPf et en diminution pour le réseau sentinelles.

### AUTRES ACTUALITES LOCALES

#### Salmonellose à *Salmonella enteritidis*

- Quelques cas sont sporadiquement signalés (*S. enteritidis* et autres types).
- Par mesure de précaution, il est toujours recommandé de consommer les œufs bien cuits : blanc et jaune (cuisson 5 minutes au minimum à 65°C).
- Les mesures de contrôles mises en place ont permis d'affirmer l'absence de *S. enteritidis* dans les élevages professionnels de poules pondeuses dans les îles. Pour Tahiti, les mesures sanitaires d'abattage et de désinfection appliquées à tous les élevages incriminés, ainsi que la mise en place de nouvelles mesures sanitaires efficaces permettent d'envisager la finalisation prochaine des opérations d'assainissement sanitaire des élevages professionnels. Les contrôles réguliers sont suivis par les services de contrôle.

#### Leptospirose

- Bilan au 22 février 2013 : 15 cas de leptospirose ont été confirmés en décembre 2012, 17 cas en janvier et 10 cas en février.

### ACTUALITES REGIONALES ET INTERNATIONALES

(sources : InVS, PacNet, OMS, ProMed, autres)


#### Dengue - Nouvelle-Calédonie

- Bilan au 22/02/2013 : depuis le début de la circulation du virus DEN I en Nouvelle-Calédonie en septembre 2012, 2840 cas ont été confirmés. 965 cas en janvier, et 1402 cas depuis le 1er février : 453 en semaine 7 et 437 en semaine 8.
- **Il est recommandé d'effectuer un prélèvement face à toute suspicion clinique de dengue, en particulier chez des personnes ayant voyagé en Nouvelle-Calédonie dans la semaine précédente.**
- Pour information complémentaire, consultez le site internet de la DASS Nouvelle-Calédonie : [http://www.dass.gouv.nc/portal/page/portal/dass/observatoire\\_sante/veille\\_sanitaire/Dengue](http://www.dass.gouv.nc/portal/page/portal/dass/observatoire_sante/veille_sanitaire/Dengue)


#### Grippe

- En France métropolitaine, la circulation des virus A et B se poursuit et se stabilise à un niveau élevé. C'est la neuvième semaine consécutive d'épidémie.
- L'activité grippale reste minimale en Australie et en Nouvelle-Zélande.



## Grippe





## Fièvre isolée




## Dengue



## Diarrhées



## Indicateurs d'activité



### Bulletin téléchargeable sur les sites suivants :

- Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique [http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine\\_reports.htm](http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm)
- Centre d'hygiène et de salubrité publique de la Direction de la santé <http://www.hygiene-publique.gov.pf/spip.php?article120>

### Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelles

- Syndrome grippal : Fièvre élevée ( $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ ) d'apparition brutale, ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL
- Suspicion de dengue : Fièvre élevée ( $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ ) d'apparition brutale de moins de 8 jours, ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies) ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)
- Diarrhées : au moins 3 selles liquides ou molles / jour, datant de moins de 14 jours ET motivant la consultation
- Fièvre isolée : Fièvre élevée ( $> 38^{\circ}\text{C}$ ) de plus de 3 jours sans cause évidente

### Définitions utilisées pour la surveillance virologique

- Cas confirmé de dengue : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 / RT PCR / IgM

### Codage CIM 10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences

- Syndrome grippal : J11
- Suspicion de dengue : A90 - A91
- Diarrhée : A02 à A09
- Fièvre isolée : R509

### Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :

- Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé
- Centre de la mère et de l'enfant
- Réseau des médecins sentinelles
- Service de Santé des Armées
- Centre Hospitalier du Taaone
- Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae
- Institut Louis Malardé
- Laboratoires privés
- Cliniques privées Cardella et Paofai
- Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la Santé
- Pharmacies d'officine
- Centre d'hygiène et de salubrité publique
- Réseau informatique de santé publique de la Direction de la Santé

### Bureau de veille sanitaire :

**Responsable**  
Dr Henri-Pierre Mallet

**Epidemiologiste**  
Anne-Laure Berry

**Infirmiers**  
Jean-Paul Pescheux  
Auguste Buluc

**Secrétaire**  
Thilda Tehaamoana

Tél: 488 201  
Fax: 488 212

**Astreinte : 706 502**

Mail : [veille@sante.gov.pf](mailto:veille@sante.gov.pf)